

## **COMUNICADO DE SEGURIDAD**

EL PROGRAMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA
DEL DEPARTAMENTO DE REGULACION Y CONTROL DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS AFINES

## A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

## FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA)

Guatemala 21 de Enero 2016

Los inhibidores de DPP-4, estos fármacos inhibidores de la dipeptidilpeptidasa-4 (inhibidores DPP-4), (sitagliptina, saxagliptina, linagliptina) medicamentos utilizados para el tratamiento de la Diabetes tipo II, solos o combinaciones a dosis fijas, con otro hipoglucemiante.

La FDA advierte que estos medicamentos pueden provocar dolor articular grave, que puede llegar hacer incapacitante, en estos casos el medicamento debe descontinuarse.

## Entre tanto recomienda a los profesionales sanitarios

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas a medicamentos al <u>Programa Nacional de Farmacovigilancia</u> (3ª. Calle final, 2-10 Zona 15, Colonia Valles de Vista Hermosa, Tel. 25022503 ext. 115 a través de la Boleta Amarilla, disponible en www.medicamentos.com.gt